

Клінічні дослідження

УДК: 616.12-008.313:616.12-073.7

ЗАВИСИМОСТЬ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ КОМПЛЕКСА QRS ЕКГ ОТ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ ФИБРИЛЛЯЦІЇ ПРЕДСЕРДІЙ

I.Yu. Burda

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Україна

Ізучена залежність тривалості комплексу QRS ЕКГ від сукупності клініческих проявлень фібриляції предсердій (ФП) у 126 пацієнтів в віці (65 ± 10) років з давністю захворювання (6 ± 5) років. Диапазон тривалості комплексу QRS ЕКГ склав $(65-190)$ мс. У 54% пацієнтів був подовжений комплекс QRS ЕКГ, вкорочених комплексів QRS ЕКГ не наблюдалось. Частота внутрішньошлуночкових блокад у пацієнтів з нормальним комплексом QRS ЕКГ складала 14%, з удлиненим – 41%. У пацієнтів з удлиненим комплексом QRS ЕКГ та внутрішньошлуночковими блокадами були більш важкі клінічні прояви ФП, ніж без блокад. Блокада лівої ніжки пучка Гіса та двупучкові блокади асоціювалися з більш важкими клінічними проявами ФП, ніж інші види внутрішньошлуночкових блокад. З подовженням комплексу QRS ЕКГ збільшувався функціональний клас серцевої недостатності, ступінь артеріальної гіпертензії, передньо-задній розмір лівого предсердія, кінцево-диастолічний діаметр та товщина задньої стінки лівого желудочка (ЛЖ), знижувалася фракція выброса ЛЖ та частота сердечних сокращень.

КЛЮЧЕВІ СЛОВА: тривалість комплексу QRS ЕКГ, фібриляція предсердій, удлинений комплекс QRS ЕКГ, вкорочений комплекс QRS ЕКГ

ЗАЛЕЖНІСТЬ ТРИВАЛОСТІ КОМПЛЕКСУ QRS ЕКГ ВІД КЛІНІЧНИХ ПРОЯВІВ ФІБРИЛЯЦІЇ ПЕРЕДСЕРДЬ

I.Yu. Burda

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Україна

Досліджено залежність тривалості комплексу QRS ЕКГ від сукупності клінічних проявів фібриляції передсердій (ФП) у 126 пацієнтів віком (65 ± 10) років з давністю захворювання (6 ± 5) років. Діапазон тривалості комплексу QRS ЕКГ склав $(65-190)$ мс. У 54% пацієнтів був подовжений комплекс QRS ЕКГ, вкорочених комплексів QRS ЕКГ не спостерігалося. Частота внутрішньошлуночкових блокад у пацієнтів з нормальним комплексом QRS ЕКГ складала 14%, з подовженням – 41%. У пацієнтів з подовженим комплексом QRS ЕКГ та внутрішньошлуночковими блокадами були більш важкі клінічні прояви ФП, ніж без блокад. Блокада лівої ніжки пучка Гіса та двупучкові блокади асоціювалися з більш важкими клінічними проявами ФП, ніж інші види внутрішньошлуночкових блокад. З подовженням комплексу QRS ЕКГ збільшувався функціональний клас серцевої недостатності, ступінь артеріальної гіпертензії, передньо-задній розмір лівого передсердія, кінцево-диастолічний діаметр та товщина задньої стінки лівого шлуночка (ЛШ), знижувалася фракція викиду ЛШ та частота серцевих скорочень.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: тривалість комплексу QRS ЕКГ, фібриляція передсердій, подовжений комплекс QRS ЕКГ, вкорочений комплекс QRS ЕКГ

RELATIONSHIP BETWEEN THE QRS COMPLEX DURATION AND CLINICAL MANIFESTATION OF ATRIAL FIBRILLATION

I.Yu. Burda

V.N. Karazin Kharkov National University, Ukraine

Relationship between the QRS complex duration (QRSD) and clinical manifestation of atrial fibrillation (AF) was studied in 126 patients mean age (65 ± 10) years with duration of the disease (6 ± 5) years. In study population the range of QRSD was $(65-190)$ ms. Of these patients, 54 % had prolonged QRS complexes, shortened QRS complexes were absent. The frequency of intraventricular blocks in patients with normal QRS complex was 14% and with prolonged – 41%. Patients with prolonged QRS complex and intraventricular blocks had more severe clinical manifestation of AF, than without blocks. Left bundle branch block and bifascicular block were associated with more severe clinical manifestation of AF than other types of intraventricular blocks. QRS complex prolongation was associated with the increase in severity of heart failure and arterial hypertension, left atrial anteroposterior diameter, left ventricular (LV) end-diastolic diameter, LV posterior wall thickness and decrease of the LV ejection fraction and heart rate.

KEY WORDS: QRS complex duration, atrial fibrillation, prolonged QRS complex, shortened QRS complex

Фибрилляция предсердий (ФП) – наиболее широко встречающаяся в клинической практике аритмия, составляющая треть из всех случаев госпитализации по поводу нарушений ритма [1]. Распространенность ФП увеличивается с возрастом и составляет менее 1 % у лиц моложе 60 лет и почти 10 % у лиц старше 80 лет [1, 2]. ФП может быть как следствием, так и единственной причиной развития сердечной недостаточности (СН) [1, 3]. Распространенность ФП увеличивается с 10 до 40% по мере нарастания тяжести СН от I до IV функционального класса (ФК) [3]. ФП ассоциируется с повышенным риском развития инсульта и более высокой общей смертностью [4, 5].

Изменение продолжительность комплекса QRS электрокардиограммы (ЭКГ) в сторону укорочения или удлинения может приводить к электрической нестабильности миокарда и развитию фатальных желудочковых аритмий [6], внутри- и/или межжелудочковому асинхронизму [7, 8, 9, 10, 11], ремоделированию миокарда, нарушению внутрисердечной гемодинамики [12, 13], снижению эффективности сердечного выброса и является независимым предиктором высокого риска смерти [14, 15, 16, 17].

Несмотря на высокую актуальность проблемы продолжительности комплекса QRS ЭКГ при ФП, она остается слабо изученной. Имеются данные [18], что у пациентов с застойной СН сочетание блокады левой ножки пучка Гиса (ЛНПГ) с ФП ассоциируется со значительным увеличением смертности. Согласно данным [2], прогрессивное увеличение продолжительности комплекса QRS ЭКГ является предиктором неблагоприятного прогноза у пациентов с ФП.

Притом, что частой причиной удлинения комплекса QRS ЭКГ являются внутрижелудочковые блокады, их связь с удлиненным комплексом QRS ЭКГ не изучалась.

Данная работа выполнена в рамках НИР ХНУ имени В.Н. Каразина «Разработка и исследование системы автоматического управления вариабельностью сердечного ритма», № регистрации 0109U000622.

Целью работы является изучение зависимости продолжительности комплекса QRS ЭКГ от клинических проявлений ФП для разработки предложений по повышению качества ее диагностики и лечения.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

На базе кардиологического отделения Государственного лечебно-профилактического учреждения «Центральная клиническая больница Укрзализныци» обследовано 126 пациентов с ФП (84 мужчины и 42 женщи-

ны) в возрасте (65 ± 10) лет. Средняя продолжительность заболевания на момент обследования составила (6 ± 5) лет. У 81 пациента диагностирована постоянная, у 34 – персистирующая и у 11 – пароксизмальная ФП. Артериальная гипертензия (АГ) имела место у 107, ишемическая болезнь сердца (ИБС) – у 78, патология клапанов сердца – у 27 пациентов. У 20 пациентов были симптомы СН I ФК, у 58 – СН II ФК, у 45 – СН III ФК.

В исследование не включались лица со стабильной стенокардией напряжения IV ФК, острым коронарным синдромом, СН IV ФК.

Оценивались следующие классифицирующие признаки: пол (мужской, женский); возраст – зрелый (мужчины 45-60 лет, женщины 45-55 лет), – пожилой (мужчины 61-74 года, женщины 56-74 года), – старческий (мужчины и женщины 75-87 лет); форма ФП (постоянная, персистирующая и пароксизмальная); класс частоты сердечных сокращений (ЧСС) – бради- (менее 60 уд/мин), нормо- (60-90 уд/мин) и тахисистолическая ФП (более 90 уд/мин); степень тяжести СН (I-III ФК); фракция выброса (ФВ) левого желудочка (ЛЖ) (20-42%, 43-65% и 66-88%); конечно-диастолический диаметр (КДД) ЛЖ (до и более 55 мм); переднезадний размер левого предсердия (ЛП) (до и более 40 мм); толщина задней стенки (ТЗС) ЛЖ (до 14 и более 14 мм); уровень систолического и диастолического артериального давления (САД и ДАД): нормальное АД (САД менее 140 мм рт.ст., ДАД менее 90 мм рт.ст.); мягкая АГ (САД 140-159 мм рт.ст., ДАД 90-99 мм рт.ст.); умеренная АГ (САД 160-179 мм рт.ст., ДАД 100-109 мм рт.ст.); тяжелая АГ (САД 180 и более мм рт.ст., ДАД 110 и более мм рт.ст.).

Для диагностирования ФП, внутрижелудочковые блокады и измерения продолжительности комплекса QRS ЭКГ производилась регистрация ЭКГ на компьютерном электрокардиографе «Cardiolab+». Продолжительность комплекса QRS ЭКГ измеряли в отведениях II, V₁, V₅, V₆ (три последовательных комплекса) с выбором максимального значения для отведения и зарегистрированных комплексов. Оценка ФВ, КДД, ТЗС ЛЖ и переднезаднего размера ЛП производилась с помощью эхокардиографа «SIM 5000 plus». САД и ДАД измеряли по методу Короткова тонометром Microlife BP AG1-20.

Для изучения связи между клиническими проявлениями ФП и продолжительностью комплекса QRS ЭКГ были выделены следующие ее диапазоны: (61-70) мс, (71-80) мс, (81-90) мс, (91-100) мс, (101-110) мс, (111-

120) мс, (121-130) мс, (131-140) мс, (141-150) мс, (151-160) мс, (161-170) мс, (171-180) мс, (181-190) мс. Также выделены следующие классы продолжительности комплекса QRS ЭКГ: укороченный (менее 60 мс), нормальный (60-100 мс) и удлиненный (более 100 мс).

Данные заносились в базу Microsoft Excel. Строилась таблица, в которой представлялись абсолютное количество пациентов (n) и частотное соотношение в пределах каждого подкласса (p). Для статистической оценки результатов использовались параметрические критерии (среднее значение (M) и стандартное отклонение (sd), асимметрия и эксцесс).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В изученной популяции пациентов с ФП диапазон продолжительности комплекса QRS ЭКГ составляет (65-190) мс (рис.). У 46% пациентов продолжительность комплекса

QRS ЭКГ находится в пределах физиологических значений, у 54% – имеет место удлиненный комплекс QRS ЭКГ. Укороченных комплексов QRS ЭКГ не наблюдается. Распределение продолжительности комплекса QRS ЭКГ асимметричное со сдвигом в сторону более коротких значений: асимметрия распределения продолжительности комплекса QRS ЭКГ составляет (1,26), эксцесс – (1,96).

В табл. 1 представлено распределение пациентов с ФП по выделенным диапазонам продолжительности комплекса QRS ЭКГ. Выделены следующие классы диапазонов: нормальной продолжительности комплекса QRS ЭКГ, некритического удлинения и критического удлинения комплекса QRS ЭКГ, в определенных случаях требующего проведения сердечной ресинхронизирующей терапии.




Рис. Распределение продолжительности комплекса QRS ЭКГ в изученной популяции пациентов

Таблица 1
Распределение пациентов с ФП по выделенным диапазонам продолжительности комплекса QRS ЭКГ

Класс диапазона	Диапазон продолжительности комплекса QRS ЭКГ, мс	Число пациентов, n (р(%, %))						
		Всего	Без в/ж блокад	Внутрижелудочковые (в/ж) блокады				
				Все в/ж блокады	Блокада ПНПГ	Блокада ЛНПГ	Блокада ветвей ЛНПГ	Двухпучковые блокады
Нормальный	61-70	1 (100)	1 (100)	-	-	-	-	-
	71-80	9 (100)	8 (89)	1 (11)	-	-	1 (11)	-
	81-90	12 (100)	11 (92)	1 (8)	-	-	1 (8)	-
	91-100	36 (100)	30 (83)	6 (17)	4 (11)	1 (3)	1 (3)	-
Некритическо-го удлинения	101-110	24 (100)	22 (92)	2 (8)	1 (4)	-	1 (4)	-
	111-120	20 (100)	14 (70)	6 (30)	2 (10)	2 (10)	2 (10)	-
Критического удлинения	121-130	7 (100)	2 (29)	5 (71)	4 (57)	-	-	1 (14)
	131-140	5 (100)	1 (20)	4 (80)	2 (40)	1 (20)	1 (20)	-
	141-150	4 (100)	1 (25)	3 (75)	2 (50)	-	-	1 (25)
	151-160	4 (100)	-	4 (100)	2 (50)	1 (25)	-	1 (25)
	161-170	1 (100)	-	1 (100)	-	1 (100)	-	-
	171-180	1 (100)	-	1 (100)	1 (100)	-	-	-
	181-190	2 (100)	-	2 (100)	1 (50)	1 (50)	-	-

В диапазонах нормальной продолжительности и некритического удлинения комплекса QRS ЭКГ преобладают пациенты без внут-

трижелудочных блокад, в диапазоне критического удлинения комплекса QRS ЭКГ большинство пациентов имеют внутрижелу-

дочковые блокады. Удлинение комплекса QRS ЭКГ за счет неспецифического замедления внутрижелудочковой проводимости представлено преимущественно в диапазоне (101-120 мс), удлинение комплекса QRS ЭКГ за счет внутрижелудочковых блокад – в диапазоне (121-190) мс.

С удлинением комплекса QRS ЭКГ наблюдается увеличение частоты внутрижелудочковых блокад. При этом она у пациентов с нормальной продолжительностью комплекса QRS ЭКГ не превышает 17% и дости-

гает 100% у пациентов с продолжительностью комплекса QRS ЭКГ более 150 мс. Внутрижелудочковые блокады у пациентов с нормальной продолжительностью комплекса QRS ЭКГ представлены преимущественно блокадой ПНПГ и блокадой ветвей ЛНПГ, у пациентов с удлиненным комплексом QRS ЭКГ – всеми видами внутрижелудочковых блокад.

Связь между продолжительностью комплекса QRS ЭКГ и клиническими признаками ФП представлена в табл. 2.

Таблица 2

Связь между продолжительностью комплекса QRS ЭКГ и клиническими признаками ФП

Клинические признаки		QRS ЭКГ, мс	Число пациентов, n (р, %)					
			Всего	Без в/ж блокад	Внутрижелудочковые (в/ж) блокады			
Пол	М	111±24	84 (100)	58 (69)	26 (31)	10 (12)	7 (8)	6 (7)
	Ж	109±22	42 (100)	32 (76)	10 (24)	9 (21)	-	1 (2)
Возраст, лет	Зрелый	105±19	45 (100)	34 (76)	11 (24)	5 (11)	1 (2)	5 (11)
	Пожилой	106±18	57 (100)	46 (81)	11 (19)	7 (12)	2 (3,5)	2 (3,5)
	Старческий	128±32	24 (100)	10 (42)	14 (58)	7 (29)	4 (17)	3 (12)
ЧСС уд/мин	До 60	129±33	11 (100)	7 (64)	4 (36)	-	3 (27)	-
	60-90	110±23	70 (100)	50 (71)	20 (29)	13 (19)	3 (4)	3 (4)
	Более 90	106±18	45 (100)	33 (73)	12 (27)	6 (14)	1 (2)	4 (9)
Форма ФП	Пароксизмальная и персистирующая	111±25	45 (100)	31 (69)	14 (31)	4 (9)	5 (11)	4 (9)
	Постоянная	109±22	81 (100)	59 (73)	22 (27)	15 (19)	2 (2)	3 (4)
ФК СН	I	105±16	20 (100)	15 (75)	5 (25)	2 (10)	1 (5)	2 (10)
	II	108±19	58 (100)	43 (74)	15 (26)	8 (14)	4 (7)	2 (3)
	III	116±30	45 (100)	30 (68)	15 (32)	9 (20)	2 (4)	2 (4)
	Без СН	98±3	3 (100)	2 (67)	1 (33)	-	-	1 (33)
Уровень АД	Норма	108±28	19 (100)	14 (74)	5 (26)	3 (16)	-	2 (10)
	Мягкая АГ	107±21	14 (100)	10 (71)	4 (29)	-	3 (22)	-
	Умерен. АГ	108±22	68 (100)	49 (72)	19 (28)	12 (18)	3 (4)	3 (4)
	Тяжелая АГ	118±24	25 (100)	17 (68)	8 (32)	4 (16)	1 (4)	2 (8)
ФВ ЛЖ, %	20-42	118±33	15 (100)	10 (67)	5 (33)	1 (6)	2(15)	1(6)
	43-65	110±25	72 (100)	52 (72)	20 (28)	11 (15)	4 (6)	4 (6)
	66-88	109±20	39 (100)	28 (72)	11 (28)	7 (18)	1 (3)	2 (4)
КДД ЛЖ, мм	Менее 55	108±22	80 (100)	57 (71)	23 (29)	15 (19)	3 (4)	5 (6)
	55 и более	113±25	46 (100)	33 (72)	13 (28)	4 (9)	4 (9)	2 (4)
Размер ЛП, мм	Менее 40	109±23	77 (100)	49 (64)	28 (36)	14 (18)	6 (8)	6 (8)
	40 и более	111±23	49 (100)	41 (84)	8 (16)	5 (10)	1 (2)	1 (2)
ТЗС ЛЖ, мм	Менее 14	107±21	54 (100)	42 (78)	12 (22)	10 (18)	-	2 (4)
	14 и более	113±24	72 (100)	48 (67)	24 (33)	9 (12)	7 (10)	5 (7)
								3 (4)

Продолжительность комплекса QRS ЭКГ у мужчин превышает таковую у женщин. Внутрижелудочковые блокады встречаются почти у трети мужчин и у четверти женщин. У женщин внутрижелудочковые блокады представлены блокадой ПНПГ и блокадой ветви ЛНПГ. Блокады ЛНПГ и двухпучковые блокады наблюдаются только у мужчин.

С возрастом удлиняется комплекс QRS

ЭКГ и увеличивается частота внутрижелудочковых блокад. Изолированные блокады ветвей ЛНПГ встречаются только у пациентов зрелого и пожилого возраста, а двухпучковые – старческого. Блокады ЛНПГ наиболее часто встречаются у пациентов старческого возраста.

С увеличением ЧСС наблюдается укорочение комплекса QRS ЭКГ. Наиболее часто

внутрижелудочковые блокады встречаются при брадисистолической форме ФП, наименее часто – тахисистолической форме ФП.

С повышением ФК СН удлиняется комплекс QRS ЭКГ и возрастает частота внутрижелудочковых блокад.

С увеличением тяжести АГ наблюдаются удлинение комплекса QRS ЭКГ и рост частоты внутрижелудочковых блокад. У пациентов с нормальным уровнем АД внутрижелудочковые блокады представлены блокадой ПНПГ и ветвей ЛНПГ, у пациентов с мягкой АГ – преимущественно блокадой ЛНПГ, у пациентов с умеренной и тяжелой АГ – всеми видами внутрижелудочковых блокад.

Максимальная продолжительность комплекса QRS ЭКГ и наибольшая частота внутрижелудочковых блокад наблюдаются при пароксизмальной и персистирующей форме ФП. При постоянной форме ФП преобладает блокада ПНПГ, при пароксизмальной и персистирующей – блокада ЛНПГ.

С снижением ФВ ЛЖ удлиняется комплекс QRS ЭКГ и увеличивается частота внутрижелудочковых блокад. У пациентов с ФВ ЛЖ в диапазоне (20-42)% преобладают блокады ЛНПГ, и в диапазоне (43-88)% – блокады ПНПГ.

С увеличением КДД ЛЖ удлиняется комплекс QRS ЭКГ. Частота внутрижелудочко-

вых блокад приблизительно равна в обоих подклассах КДД ЛЖ. У пациентов с КДД ЛЖ менее 55 мм внутрижелудочковые блокады представлены преимущественно блокадой ПНПГ, у пациентов с КДД ЛЖ 55 мм и более – всеми видами блокад.

С увеличением переднезаднего размера ЛП наблюдаются удлинение комплекса QRS ЭКГ и уменьшение частоты внутрижелудочковых блокад.

С увеличением толщины задней стенки ЛЖ наблюдаются удлинение комплекса QRS ЭКГ и рост частоты внутрижелудочковых блокад. В первом подклассе толщины задней стенки ЛЖ имеют место только блокады ПНПГ и ветвей ЛНПГ, второй подкласс представлен всеми видами внутрижелудочковых блокад.

В табл. 3 представлена сравнительная характеристика клинических признаков ФП у пациентов с удлиненным комплексом QRS ЭКГ с внутрижелудочковыми блокадами и без них. У пациентов с внутрижелудочковыми блокадами продолжительность комплекса QRS ЭКГ, возраст, ЧСС, ФВ, КДД и ТЗС ЛЖ превышают таковые у пациентов без блокад. Переднезадний размер ЛП у пациентов без внутрижелудочковых блокад превышает такой у пациентов с блокадами.

Таблица 3

**Сравнительная характеристика клинических признаков ФП
у пациентов с удлиненным комплексом QRS ЭКГ (M, sd)**

Внутрижелудочковые блокады	QRS, мс	Возраст, лет	ЧСС, уд/мин	ФВ, %	КДД, мм	ЛП, мм	ТЗС, мм
Нет	113±10	64±8	74±23	58±15	52±8	40±6	14±2
Есть	141±23	72±10	79±19	59±14	53±6	38±7	15±3

В изученной популяции пациентов с ФП имеют место только нормальные и удлиненные комплексы QRS ЭКГ. Отсутствие укороченных комплексов QRS ЭКГ подтверждает данные [6, 19, 20] об их крайне редкой встречаемости.

Нам встретилась только одна публикация, в которой изучалась частота внутрижелудочковых блокад (а именно – полной блокады ЛНПГ) у пациентов с ФП [18]. Полученная в нашей работе доля пациентов с ФП и полной блокадой ЛНПГ (4,7) близка к установленной [19] (3,3).

Нам не удалось найти публикаций, в которых была бы изучена связь удлиненного комплекса QRS ЭКГ с внутрижелудочковыми блокадами.

В нашей работе удлинение комплекса QRS ЭКГ у пациентов с ФП преимущественно за счет внутрижелудочковых блокад представлено в диапазоне (121-190) мс и за счет неспецифического замедления внутрижелудочковой проводимости – в диапазоне

(101-120 мс). Частота внутрижелудочковых блокад у пациентов с ФП и нормальным комплексом QRS ЭКГ составляет 14%, у пациентов с удлиненным комплексом QRS ЭКГ – 41%. Согласно результатам нашего исследования у пациентов с удлиненным комплексом QRS ЭКГ и внутрижелудочковыми блокадами имеют место более тяжелые клинические признаки ФП и большая продолжительность комплекса QRS ЭКГ, чем без блокад.

В нашей работе мы выявили, что внутрижелудочковые блокады ассоциируются с мужским полом, брадисистолической формой ФП, пароксизмальной и персистирующей ФП. Частота внутрижелудочковых блокад повышается с возрастом, увеличением тяжести СН и АГ, снижением ФВ ЛЖ и утолщением задней стенки ЛЖ, уменьшением переднезаднего размера ЛП и удлинением комплекса QRS ЭКГ.

Следует отметить, что блокада ЛНПГ и двухпучковые блокады ассоциируются с бо-

лее тяжелыми клиническими признаками ФП, чем другие их виды. Эти результаты в целом совпадают с данными [18, 21, 22], что блокада ЛНПГ ассоциируется с более тяжелой стадией СН, более низкой функцией ЛЖ, худшим прогнозом и более высокой общей смертностью.

Полученные результаты, в соответствии с которыми удлиненный комплекс QRS ЭКГ ассоциируется со старческим возрастом, мужским полом, более тяжелой стадией СН и сниженной ФВ ЛЖ в целом соответствуют данным [7, 14], полученным у пациентов без ФП.

Полученные нами данные о снижении ЧСС при удлинении комплекса QRS ЭКГ такие же, как и установленные Childers R и соавт. [19].

Данные о том, что удлиненный комплекс QRS ЭКГ ассоциируется с пароксизмальной и персистирующей ФП, увеличением переднезаднего размера ЛП, КДД и ТЗС ЛЖ у пациентов с ФП также являются новыми.

ВЫВОДЫ

1. В изученной популяции пациентов с ФП диапазон продолжительности комплекса QRS ЭКГ составляет (65-190) мс. У 46 % пациентов продолжительность комплекса QRS ЭКГ находится в пределах физиологических значений, у 54% – имеет место удлиненный комплекс QRS ЭКГ. Укороченных комплексов QRS ЭКГ не наблюдается. Распределение продолжительности комплекса QRS ЭКГ асимметричное со сдвигом в сторону более коротких значений.
2. С удлинением комплекса QRS ЭКГ наблюдается увеличение частоты внутрижелудочковых блокад. Частота внутрижелудочковых блокад у пациентов с ФП и нормальным комплексом QRS ЭКГ составляет 14%, у пациентов с удлиненным

комплексом QRS ЭКГ – 41%.

3. Комплекс QRS ЭКГ у пациентов с ФП удлиняется преимущественно за счет неспецифического замедления внутрижелудочковой проводимости в диапазоне (101-120) мс, за счет внутрижелудочковых блокад – в диапазоне (121-190) мс.
4. У пациентов с удлиненным комплексом QRS ЭКГ и внутрижелудочковыми блокадами имеют место более тяжелые клинические признаки ФП и большая продолжительность комплекса QRS ЭКГ, чем без блокад.
5. Внутрижелудочковые блокады у пациентов с ФП ассоциируются с мужским полом, брадисистолической формой ФП, пароксизмальной и персистирующей ФП. Их частота повышается с возрастом, увеличением тяжести СН и АГ, снижением ФВ ЛЖ и утолщением задней стенки ЛЖ, уменьшением переднезаднего размера ЛП и удлинением комплекса QRS ЭКГ.
6. Блокада ЛНПГ и двухпучковые блокады ассоциируются с более тяжелыми клиническими признаками ФП, чем другие их виды.
7. С удлинением комплекса QRS ЭКГ возрастает ФК СН, степень АГ, переднезадний размер ЛП, КДД и ТЗС ЛЖ, а также снижается ФВ ЛЖ и ЧСС.
8. В ведении пациентов с ФП важно учитывать продолжительность комплекса QRS ЭКГ и наличие внутрижелудочковых блокад. Мерой эффективности врачебных вмешательств может служить степень изменения продолжительности комплекса QRS ЭКГ.

Представляется целесообразным дальнейшее изучение роли продолжительности комплекса QRS ЭКГ в клиническом течении и исходах ФП для повышения качества диагностики и лечения заболевания.

ЛИТЕРАТУРА

1. Management of atrial fibrillation in patients with heart failure / H.R. Neuberger, C. Mewis, J. van Veldhuisen D. [et al.] // European Heart Journal. – 2007. – № 28(21). – P. 2568–2577.
2. Lin Y. Incremental Changes in QRS Duration Predict Mortality in Patients with Atrial Fibrillation / Y. Lin, Y. Liu, C. Chu // Pacing Clin Electrophysiol. – 2009. – № 32(11). – P. 1388–1394.
3. Predictors of arrhythmia recurrence in patients with lone atrial fibrillation / G. Arriagada, A. Berrezzo, L. Mont [et al.] // Europace. – 2008. – № 10(1). – P. 9–14.
4. Prevalence, incidence and lifetime risk of atrial fibrillation: the Rotterdam study / J. Heeringa, D. Kuip, A. Hofman [et al.] // European Heart Journal. – 2006. – № 27(8). – P. 949–953.
5. The Relationship Between Stature and the Prevalence of Atrial Fibrillation in Patients With Left Ventricular Dysfunction / I. Hanna, B. Heeke, H. Bush [et al.] // J Am Coll Cardiol. – 2006. – № 47. – P. 1683–1688.
6. Is a narrow and tall QRS complex an ECG marker for sudden death? / C. Wolpert, C. Veltmann, I. Gus-sak [et al.] // Heart Rhythm. – 2008. – № 5. – P. 1339–1345.
7. Cross-sectional relations of electrocardiographic QRS duration to left ventricular dimensions. The Framingham Heart Study / R. Dhingra, B. Ho Nam, E. Benjamin [et al.] // J Am Coll Cardiol. – 2005. – № 45. – P. 685–689.
8. Jeevanantham V. Cardiac resynchronization therapy in heart failure patients: an update / V. Jeevanantham, J.P. Daubert, W. Zareba // Cardiol J. – 2009. – № 16(3). – P. 197–209.

9. Left ventricular dyssynchrony evaluated by echocardiography in chronic heart failure patients with normal and wide QRS duration / Y.G. Sun, W.F. Shen, F.R. Zhang [et al.] // Zhonghua xin xue guan bing za zhi [Chinese journal of cardiovascular diseases]. – 2008. – № 36(1). – P. 44–48.
10. Prevalence of mechanical dyssynchrony in heart failure patients with different QRS durations / M. Haghjoo, A. Bagherzadeh, A.F. Fazelifar [et al.] // Pacing Clin Electrophysiol. – 2007. – № 30(5). – P. 616–622.
11. QRS and QTc interval prolongation in the prediction of long-term mortality of patients with acute destabilised heart failure / T. Breidthardt, M. Christ, M. Matti [et al.] // Heart. – 2007. – № 93. – P. 1093–1097.
12. Frequency of inter- and intraventricular dyssynchrony in patients with heart failure according to QRS width / Z. Emkanjoo1, M. Esmaeilzadeh, M. Hadil [et al.] // Europace. – 2007. – № 9(12). – P. 1171–1176.
13. Prolonged QRS Duration and Severity of Mitral Regurgitation are Unfavorable Prognostic Markers of Heart Failure in Patients With Nonischemic Dilated Cardiomyopathy / E. Amiya, K. Tanabe, Y. Ikari [et al.] // Circulation Journal. – 2006. – № 70. – P. 57–62.
14. Congestive heart failure and QRS duration establishing prognosis study/ H.J. Shenkman, V. Pampati, A.K. Khandelwal [et al.] // Chest. – 2002. – № 122. – P. 528–534.
15. Grigioni F. Prolonged QRS and QTc interval and mortality / F. Grigioni, G. Piovaccari, G.Boriani // Heart. – 2007. – № 93(9). – P. 1093–1097.
16. Relationship between QRS complex notch and ventricular dyssynchrony in patients with heart failure and prolonged QRS duration / A.F. Fazelifar, H.R. Bonakdar, K. Alizadeh [et al.] // Cardiol J. – 2008. – № 15(4). – P. 351–356.
17. Wang N.C. Clinical Implications of QRS Duration in Patients Hospitalized With Worsening Heart Failure and Reduced Left Ventricular Ejection Fraction / N.C. Wang, A.P. Maggioni, A. Marvin // JAMA. – 2008. – № 299(22). – P. 2656–2666.
18. Cumulative effect of complete left bundle-branch block and chronic atrial fibrillation on 1-year mortality and hospitalization in patients with congestive heart failure / S. Baldasseronia, De Biaseb L., C. Frescoc [et al.] // European Heart Journal. – 2002. – № 23(21). – P. 1692–1698.
19. Features of an exceptionally narrow QRS data set / R. Childers, A. Holmes, M. Kocherginsky [et al.] / Journal of Electrocardiology. – 2008. – № 41. – P. 501–507.
20. Moss A.J. Do «narrow and tall» QRS complexes «stand tall» and have arrhythmogenic implications? / A.J. Moss // Heart Rhythm. – 2008. – № 5. – № 9. – P. 1346–1346.
21. Significance of QRS morphology in determining the prevalence of mechanical dyssynchrony in heart failure patients eligible for cardiac resynchronization: particular focus on patients with right bundle branch block with and without coexistent left-sided conduction defects / M. Haghjoo, A. Bagherzadeh, M.M. Farahani [et al.] // Europace. – 2008. – № 10(5). – P. 566–571.
22. Varma N. Left ventricular conduction delays and relation to QRS configuration in patients with left ventricular dysfunction / N. Varma // Am J Cardiol. – 2009. – № 103(11). – P. 1578–1585

© Бурда І.Ю., 2010

УДК: 616.611-002-036.12-076:576.8.097

СОСТОЯНИЕ КЛЕТОЧНОГО И ГУМОРАЛЬНОГО ИММУНИТЕТА У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК В СТАДИИ: ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТОМ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ПРОГРАММНОМ ГЕМОДИАЛИЗЕ, В УСЛОВИЯХ МИКОПЛАЗМЕННОГО ИНФИЦИРОВАНИЯ

Е.М. Власенко

Харьковский национальный медицинский университет, Украина
Харьковская медицинская академия последипломного образования, Украина

Обследовано 84 больных хронической болезнью почек V стадии: гломерулонефритом, находившихся на программном гемодиализе по поводу терминальной уремии. У 44 (52%) пациентов в плазме крови были обнаружены специфические антимикоплазменные антитела к *M.pneumoniae* и *M.hominis*, наблюдались изменения показателей Т-клеточного иммунитета, содержания Ig, активности комплемента и фагоцитоза по сравнению с больными гломерулонефритом без инфицирования и здоровыми донорами.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: хроническая болезнь почек, хронический гломерулонефрит, терминальная уремия, иммунитет клеточный, иммунитет гуморальный, микоплазменное инфицирование